

GO PRACTICE	Suivi en cours, inclusions closes	Patient présentant un rhumatisme inflammatoire chronique	Evaluer l'utilisation et l'efficacité d'une prescription initiale de golimumab (SIMPONI)	Etude observationnelle. Suivi sur 2 ans	Aucun	Cahier de suivi patient à compléter lors de chaque injection mensuelle	Dr Lamour, Dr Le Hénaff
ART	En cours	Patient présentant une Arthrite rhumatoïde e traités par anti TNF	Etablir un registre national prospectif de suivi des patients (PR) et traités par anti-TNF	Etude observationnelle. Suivi sur 5 ans	Aucun	Etude sur dossier. Non opposition du patient	Dr Lamour, Dr Le Hénaff
SEMAPHORE	En cours	Patients souffrant de pseudo polyarthrite rhizomélique dépendants aux stéroïdes.	Démontrer la capacité du tocilizumab par rapport au placebo à diminuer les GC (prednisone ou prednisolone) et à maintenir une faible activité de la maladie à la semaine 24	Etude prospective, randomisée, en double aveugle	Essai thérapeutique	consentement patient	Dr Lamour, Dr Le Hénaff
PROUST	En cours	patients atteints de rhumatisme psoriasique et initiant un traitement par USTekinumab	Caractériser le PROFIL des patients atteints de rhumatisme psoriasique et initiant un traitement par USTekinumab (STELARA) immunosuppresseur inhibiteur des interleukines, selon s'ils sont pris en charge par un dermatologue ou par un rhumatologue.	Etude prospective, multicentrique, non-interventionnelle	Aucun	consentement patient	Dr Lamour, Dr Le Hénaff
FLARAMIS	En cours	Patient atteint de polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée depuis moins de 3 ans selon les critères de l'ACR 1987 ou de l'ACR EULAR 2010	Evaluation de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde entre chaque visite chez le rhumatologue permet-elle de prévoir la survenue d'atteintes structurales après 24 mois de suivi ?	Etude observationnelle. Suivi 24 mois	Aucun	Etude sur dossier. Non opposition du patient	Dr Lamour, Dr Le Hénaff
GO BEYOND	En cours	Patients atteints d'une Polyarthrite Rhumatoïde (PR) et ayant reçu préalablement un traitement initial par un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNF α)	Evaluer en vie-réelle l'efficacité du golimumab chez les patients atteints d'une Polyarthrite Rhumatoïde (PR) et ayant reçu préalablement un traitement initial par un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNF α)	Etude observationnelle	Aucun	visite à 3, 6 et 12 mois	Dr Lamour, Dr Le Hénaff
TANDEM	Suivi en cours, inclusions closes	Patient présentant une polyarthrite rhumatoïde	Evaluer le taux de maintien thérapeutique du tocilizumab à 12 mois	Etude non interventionnelle, Suivi sur 12 mois	Aucun	Cahier de suivi patient à compléter lors de chaque injection mensuelle	Dr Lamour, Dr Le Hénaff